

Kontrol af slimhinder og sårheling på medicinsk kompromitterede patienter

- Herved forstås: Patienter i langvarig lavdosis bisphosphonat-behandling (fx osteoporose-pt), patienter der har fået/får højdosis bisphosphonat-behandling (fx cancer-pt), patienter som har fået/får stråling på hoved/hals, diabetes-patienter og svært svækkede patienter i øvrigt.

Personale gruppe:/gældende for: Tandplejer og tandklinikassistenter i Voksen-teamet Uddelegering: MHS, PJ, MHM, MO, JT	Udarbejdet af: CJ	Ansvarlig: Det principielle ansvar: Overtandlæge Lars Høvenhoff
Dato for ikraftsættelse: 1/6-2019	Sidste ajourført: 10/2-2023 CJ	Ajourføring af denne instruktion sker ved fremkomst af nye faglige/videnskabelige anbefalinger og senest: Marts 2026

Uddannelse/forudsætninger:

Efter oplæring ved stolen

Formål:

Opdage osteonekrose (eller tegn herpå) så tidligt som muligt, så henvisning til behandling kan foretages hurtigst muligt.

Opgave afgrænsning:

Kontrollere slimhinder

Instruktion:

Efter tandekstraktion: 2 uger efter tandudtrækning kontrolleres med den nødvendige belysning alveole/slimhinde omkring ekstraktionsalveole for blottet knogle. Evt. madrester i alveolen fjernes forsigtigt med pincet el. og der kan om nødvendigt skylles med fysiologisk saltvand. Det kontrolleres, at der er fibrindække over alveolen.

Protesebærere: Proteser fjernes fra munden og al slimhinde i relation til proteserne kontrolleres med nødvendig belysning for sår/blottet knogle samt evt. små fisteludgange.

Behandling:

Ved kontrol efter tandekstraktion: Patient/personale instrueres i grundig MH i resten af munden samt skylning med klorhexidin 0,2% hvis pt. kan kooperere til dette. Alternativt kompres med gaze vædet i khx 0,2% i 1 minut 1xdgl. Ktr. igen efter 2 uger.

Ved kontrol af protesebærere: Ved sår eller blottet knogle instrueres patient/personale i skylning med klorhexidin 0,12% og protesen aflastes svarende til regionen med såret. Alternativt kompres med gaze vædet i khx 0,2% i 1 minut 1xdgl. Ktr. igen efter 2 uger.

Patientsikkerhed: Ved manglende heling efter i alt 4 uger henvises pt til tandlæge på klinik, samt ved tvivlstilfælde i øvrigt.