

Retningslinje for håndtering af patienter med MRSA (Methicillin-resistent *Staphylococcus aureus*)

Gældende for Tandplejens medarbejdere	Udarbejdet af AM	Ansvarlig: Overtandlægen
Dato for ikrafttrædelse:	Sidst godkendt af MED: d. 22. maj 2025	Ajourføres af AM: Juni 2028

Formålet med retningslinjen er at sikre korrekt håndtering af patienter som er diagnosticeret med MRSA, og for at minimere risikoen for smittespredning til patienter og tandplejens personale.

Patienter med MRSA har krav på samme behandling som alle andre patienter, og undersøgelse/ behandling må ikke udsættes.

Definition af MRSA

MRSA er en type bakterie, der er resistent over for flere almindelige antibiotika, herunder methicillin. MRSA kan forårsage infektioner i forskellige dele af kroppen, og det kan være svært at behandle uden korrekt medicinsk intervention. Det er vigtigt at bemærke, at patienter med MRSA kan være symptomfrie, men stadig bære bakterien og dermed udgøre en smittekilde.

Håndtering af patienter med MRSA

Alle patienter skal behandles som potentielle smittebærere af MRSA, indtil andet er bekræftet. Dette gælder især, da MRSA-positive patienter ikke altid informerer om deres status. Derfor er det vigtigt at følge de samme strenge hygiejne- og beskyttelsesforanstaltninger for alle patienter for at forhindre krydskontaminering.

- **Behandlingsforberedelse:**

Uanset om patienten er bekendt med deres MRSA-status eller ej, skal alle patienter behandles med de nødvendige værnemidler og under de rette hygiejneforanstaltninger. Dette inkluderer brug af handsker, maske og beskyttelsesbriller. Engangsbeskyttelsesdragt anvendes dog kun, hvis patienten har påvist MRSA.

- **Smitteforebyggelse:**

Ved enhver behandling af patienter, der er eller kunne være bærere af MRSA, skal der anvendes samme niveau af beskyttelse, som hvis patienten var bekræftet MRSA-positiv.

Alle udstyr og instrumenter, der anvendes under behandlingen, skal desinficeres grundigt efter brug.

Overflader, der er i kontakt med patienten eller deres sekret, skal rengøres og desinficeres efter behandlingen.

- **MRSA på hud eller i sår:**

Hvis en patient har MRSA-infektion på huden eller i åbne sår, skal de relevante områder dækkes med sterile, vandtætte bandager under behandlingen for at forhindre spredning af bakterier.

Skift af arbejdstøj efter behandling af *kendt* MRSA-bærere

Arbejdstøjet skal skiftes umiddelbart efter behandling af patienter, der er kendt MRSA-bærere. Dette er for at minimere risikoen for krydskontaminering og sikre, at arbejdstøjet kun håndteres så lidt som muligt efter kontakt med smitekilder.

Samlet vurdering:

Ved at følge de fastsatte hygiejneforanstaltninger og korrekt brug af beskyttelsesudstyr kan vi sikre at alle patienter får den nødvendige behandling uden risiko for smitte.