



Smittekort – Aktiv Lunge-tuberkulose (TB)

Smittevej 		 Luftvejssekret Forurenede flader
Skærmning 	Hvor længe der skal tages ekstra forholdsregler ved aktiv lunge-tuberkulose afhænger af, hvor langt borgeren er i sin behandling. Kontakt den behandlende afdeling for afklaring.	
Håndhygiejne 		Suppleres med håndvask ved synligt forurenede og våde hænder Skærpet fokus på håndhygiejne inden boligen forlades
Skærpet brug af værnemidler 		• Ved al direkte kontakt med borger • Ved al direkte kontakt med borgernært udstyr/inventar • Ved rengøringsopgaver
		• Ved < 1 meter fra borger
Desinfektionsmiddel 	Sprit 	FFP3-maske anvendes ved CPAP, sugning, hjertelungeredning og udtalt hoste OBS! Må højst bruges 3 timer på en arbejdsdag
Rengøring  Husk! Hjælpemidlerne	På Institution: Alm. rengøring efterfulgt af: Kontaktpunkter og vandrette flader: Sprit Gulv: Alm. rengøringsmiddel *obs at fladen kan tåle sprit!  • Medbring kun nødvendigt rengøringsudstyr i boligen. • Mopper/klude emballeres i boligen. Sendes til vask. • Rengøringsudstyr rengøres og desinficeres inden det bruges i andre boliger/i fællesarealer • Rengør om muligt boligen som den sidste	Hjemmeplejen: Alm. rengøring med særlig fokus på kontaktpunkter
Snavsetøj 	Instruks "Tøjvask"	
Affald 		Luk affaldspose inde hos borger – kasseres umiddelbart efter.
Udstyr 		Begræns brug af fælles udstyr Fælles udstyr skal rengøres OG desinficeres mellem borgere
Personale 	For personale anses smitterisikoen generelt for meget lille. Immunsvækkede har større risiko end raske. Spredning af lunge-TB sker hyppigst efter langvarig og tæt kontakt med en smitsom person, og personer med ubehandlet, fremskreden lunge-TB er den vigtigste smitekilde. Generelt vurderes, at man skal have været i tættere kontakt med en person med smitsom lunge-TB (mindre end 1 meters afstand i timer) for at det udgør en signifikant smitterisiko. For alt personale gælder, at man bør søge læge, hvis man har langvarige symptomer på influenza eller hoste og ekspektorat, der ikke forsvinder inden for 4 uger	
Pårørende 		Informeres om korrekt håndhygiejne  Tilbydes mundbind ved tæt kontakt. Desuden øvrige værnemidler ved deltagelse i plejeopgaver
		Findes retningslinje fra MRSA-enheden?