

Udarbejdet af: Specialtandlæge Milo Kirk & Tom Kjellerup	Revisionsansvarlig: Specialtandlæge Milo Kirk & Tom Kjellerup	Gældende for: Klinikassistenter og tandplejere ved uddelegering
Gældende fra: 1-7-2023	Version: 3.	Ny revision senest: 1-7-2026

Instruktion til separation af tænder.

1. Formål

Forbehandling til at skabe et lille mellemrum imellem to tætsiddende tænder.

2. Målgruppe og anvendelsesområde

Patienter som skal have tilpasset metalringe (bånd) omkring tænder, der indgår i apparatur, som sidder fast, samt i forbindelse med opretning af ectopisk lejrede molarer og separation i forbindelse med stålkroner og i forbindelse med caries diagnostik approximant.

3. Forudsætning

- Sidemandsoplæring af tandlæge eller specialtandlæge.

4. Fremgangsmåde

Når en specialtandlæge vurderer, at patienten skal tilbydes denne forbehandling, følges nedenstående:

Behandlingstid: 15 min (altid i kombination med flere tider)

Påsætning af separationselastikker:

1. 3-5 dage før tilpasning af bånd/cementering, møder pt. til indsættelse af separationselastikker. Følg anvisning i BHP/journal. Normalt placeres på 6+, +6, som har kontakt med nabotænder.
2. Forbered pt. på, hvad du skal gøre, og at det vil spænde lidt de næste to dage.
3. Der skylles og tørlægges grundigt med trefunktionssprøjten, og der kontrolleres i spejlet, at der ikke sidder nogen fødeemner i approximalrummene.
4. Tag nu separationstang og placer i separationselastikken. Spænd elastikken ud.
5. Før elastikken op mod kontaktpunktet og øg det faste tryk, til der fornemmes et svup af elastikken.
6. Elastikken skal være placeret, så ringen kan ses forløbende i en cirkel omkring kontaktpunktet.
7. Træk i den med fyldningsfjerner for at sikre, den sidder godt på plads.
8. Noter i journal hvor mange separations-elastikker, der er sat op og vis pt., hvor de er placeret. Pt. skal tage kontakt, hvis en eller flere mistes. Undgå klistret føde.

Fjernelse af separations-elastikker:

1. Tjek antal i journal og antal i munden. Hvis der mangler nogen, da spørg pt. Blæs tørt i pocher og tjek der. Tag evt. rtg.
2. Elastik fjernes ved at føre fyldningsfjerner ind under den synlige del af ringen og løfte den af med et svup.
3. Hvis der skal sætte nogen på igen i samme besøg, tages nye elastikker.

5. Definitioner på kvalitetsmålinger/kontrolmålinger

1. Sep.-elastik skal placeres, så den kan modstå et let træk i ringen med fyldningsfjerner.
2. Den skal være synlig, så man fornemmer, den forløber i en cirkel omkring kontaktpunktet.

6. Ansvar og organisering

- Specialtandlægen har det overordnede ansvar.
- Indsættelse af separations-elastikker foretages af tandplejer/klinikassistent.

7. Referencer, herunder standarder, anden relevant lovgivning

- Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Se forrest i mappen.
- Vejledning om udfærdigelse af instrukser. Se forrest i mappen.
- Målepunkter for tandklinikker. Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Se forrest i mappen.

8. Bilag/links



Separating Plier



Separation rings