

MÆLKETÆNDER:

TANDEN ER SLÅET UD



1: Forsøg IKKE at sætte tanden på plads igen. Det kan skade de nye tænder, der ligger i kæben.



2: Kontakt tandlægen inden for de første par dage. Tag tanden med til tandlægen, hvis du har den. Nogle gange er tanden slået op i kæben, så den ikke kan ses, men den bryder som regel frem igen.

ANDRE TANDSKADER PÅ MÆLKETÆNDERNE



1: Kontakt tandlægen inden for de første par dage.

KNÆKKET MÆLKETAND:

Hvis der kun er knækket lidt af tanden, kan den slibes til. Hvis den er knækket ind til nerven, må den som regel trækkes ud.

LØS MÆLKETAND:

Tanden skal skånes, så den kan vokse fast igen. Bid ikke med tanden, spis blød og flydende mad.

TANDEN ER SLÅET SKÆV BARNET KAN IKKE BIDE SAMMEN



1: Kontakt straks tandlægen eller tandlægevagten. **Akutbehandling er nødvendig.**

TANDEN ER SLÅET SKÆV BARNET KAN BIDE NORMALT SAMMEN



1: Tanden skal skånes. Bid ikke med tanden, spis blød og flydende mad, så vil tanden som regel rykke sig på plads igen af sig selv.

2: Kontakt tandlægen inden for de første par dage.

EFTER SKADEN

Hold øje med om tanden skifter farve efter nogen tid, og om der evt. kommer en tandbyld (en lille blære på tandkødet ud for tanden).

Kontakt tandlægen, hvis du er i tvivl.

Husk at melde skaden til ulykkesforsikringen. Skader på mælketænder kan påvirke de nye tænder.

FØRSTEHJÆLP TIL TANDSKADER



Din lokale tandpleje:

Tandlægevagt:



Støttet af:



Tjenestemændenes Forsikring




BLIVENDE TÆNDER:




TANDEN ER SLÅET UD

- 1:** Find tanden. Hold på tandens hvide del, så du ikke beskadiger roden. Det øger chancen for, at tanden kan vokse fast igen.



- 2:** Det er meget vigtigt, at tanden ikke udtørres. Du kan gøre en af disse tre ting for at passe på tanden:

- Sæt tanden ind på plads i tandrækken. Skyl tanden forsigtigt under den kolde hane i 10 sek., hvis der er synligt snavs.
- Opbevar tanden i spyt eller mælk. OBS! Ikke i vand.
- Læg tanden forsigtigt i munden mellem kinden og tænderne.



- 3:** Kontakt straks tandlægen eller tandlægevagten. Akut behandling er nødvendig.



TANDEN ER KNÆKKET

- 1:** Find tandstumpen.




- 2:** Læg den i mælk eller spyt.



- 3:** Kontakt tandlægen eller tandlægevagten. Nogle gange kan tandstumpen limes på igen. Ellers kan tanden repareres med plast.



TANDEN ER SLÅET SKÆV



- 1:** Kontakt straks tandlægen eller tandlægevagten. Akut behandling er nødvendig.

TANDEN ER SLÅET LØS

- 1:** Hvis tanden er meget løs, så kontakt straks tandlægen eller tandlægevagten. Måske skal den limes fast til de andre tænder.
- 2:** Hvis tanden kun er lidt løs, kan den vokse fast igen i løbet af 1-2 uger. Bid ikke med tanden, spis blød og flydende mad. Kontakt tandlægen inden for de første par dage.

FORSIKRING

Hvis der sker skader på tænderne, behandles de gratis i den kommunale tandpleje, indtil barnet er 18 år. Nogle gange skal der større dyre behandlinger til (f.eks. kroner, broer eller implantater), som først kan foretages, når kæberne er færdige med at vokse efter 20-årsalderen. Derfor er det en god idé at tegne en ulykkesforsikring, der dækker tandskader. Husk altid at melde tandskader til forsikringen.