



En Case

Pt lige før hun fylder 15 år (født i 1997)



21-11-12 11:06 Undersøgelse.BW's viser:Ingen fyldningskrævende caries, men flere obs'er. Speciel -7 fl.1. Følges på rtg. Pt. inform. Pæn hyg.Fissurforsøgling af 7±7. Relak 6+6 Og 2+2.Færdig.

2 år tidligere var dette billede taget



16-11-10 13:07 Kontrol reg +3.+03 persisterer.Rtg reg +3 viser, at +03 er resorberet.+3 kan palpres facialet. Evt . ex.
+03 ? Til OR-revisit ifølge plan.

1. Diagnose

2. Kontrol/Motivation

3. Cephalometri

4. Røntgen

5. 3D

6. Behandling

7. Behandlingsanalyse

8. Faser

Diagnosedato

to 02-12-2010

☐ Manuel dato

Dentition

DS

3

M

1

+3 kan palperes facielt, +03 løsnet af 1. grad

Okklusion

	6+	Højre	3+	OK	Front (HOB, VOB og Midtlinie)	UK	+3	Venstre	+6
Sagittal	Normalt			+1 mm				Normalt	
Vertikal	Normalt			Normalt			Normalt		
Transversal	Normalt				OK forskudt t.v.1mm		Normalt		

Plads

OK	Normalt	Normalt	Normalt
UK	Normalt	Normalt	Normalt

Funktion

Læber	i.a.	Gingivapåbid.		Tunge	
Muskler		Led	i.a.	Føring	
Slid		Profil		En face	

Andet

Mundhygiejne		Motivation		Risiko	
--------------	--	------------	--	--------	--

Resttandskiftet forventes at forløbe normalt


05-01-11 12:10 Undersøgelse. Ingen fyldningskrævende caries. Pænt hyg. +03 er begyndende løs.

21-11-12 11:06 Undersøgelse.BW's viser:Ingen fyldningskrævende caries, men flere obs'er. Speciel -7 fl.1. Følges på rtg.
Pt. inform. Pæn hyg.Fissurforsøgling af 7±7. Relak 6+6 Og 2+2.Færdig.

24-02-14 08:16 Mor ringer, hun ønsker at Clara har xx som tandlæge. Besked videregivet til xx

07-03-14 08:19 Sendt udskrivningsbrev og 2 bw med sikker mail til xx.

10-03-14 08:59 Papjournal arkiveret under årgang 97. Færdig.



Røntgenbilleder kan rekvireres elektronisk ved henvendelse til tandplejen@randers.dk

Caries:		Tandtraume: I.a			
Fyldt siden optagelse af bitewings		Tand			
		Diagnose			
		Dato			
Initialcaries, som ikke er fyldnings-krævende	7+ ¹ ; 6+ ¹ ; 2+ ⁵ ; +2 ⁵ ; +6 ¹ ; +7 ¹ 7- ¹ ; -7 ¹	Sidste kontrol			
		Forsikringstilsagn			
Tandregulering:					
Ikke indikation * X		Ikke ønsket	Er i gang	Er blevet afbrudt	Gennemført
* Sundhedsstyrelsens kriterier for tandregulering					
Agenesi, extraheret eller pulpabehandlet:	I.a				
Andre forhold af betydning for den videre behandling, herunder helbredsoplysninger: 7±7, 2,6+6,2 er fissurforseglet, obs følges.					

31/3/2014 KK OBS 5+ flade 4.

Undersøgelse. Slimhinder: i.a. Lymfeknuder: i.a Tyggemusklér: i.a

Parodontium: Enkelte pocher på 4 mm. Skærpet brug af tt dgl., samt bedre børstning af gingivalrand generelt.

Mundhyg.: OK Bidfunktion: i.a.Rygning: Nej Medicin: i.a.

Tandpasta: colgate complete

Særlige fokusområder: Parodontitis marginalis adulta progressiva lenta

Indkaldeinterval: 6 mdr

RTG. BW højre side. Indikation: Som led i den diagnostiske undersøgelse af caries og anden patologi

RTG. BW venstre side. Indikation: Som led i den diagnostiske undersøgelse af caries og anden patologi

Caries -7 flade 1.

OBS 7+ flade 13.

OBS 6+ flade 12.

OBS 5+ flade 4.

OBS 2+ flade 5.

OBS +2 flade 5.

OBS +6 flade 1.

OBS +7 flade 1. Stor obs

OBS -6 flade 13c.

OBS 5- flade 4.

OBS 7- flade 1. Stor obs

Tandrensning over 14 tænder.

SLUT.

20/10/2014 Undersøgelse. Slimhinder: i.a. Lymfeknuder: i.a Tyggemusklér: i.a
Parodontium: Enkelte pocher på 4 mm. Skærpet brug af tt dgl., samt
bedre børstning af gingivalrand generelt.

Mundhyg.: OK. Anbefalet bedre børstning langs gingivalrand i
molarregioner i både OK og UK. Pt. fortæller hun er blevet bedre til at
bruge tt

Bidfunktion: i.a.

Rygning: Nej

Medicin: i.a.

Tandpasta: colgate complete

Særlige fokusområder: Gingivitis samt initial caries

RTG +3. Indikation; Aplasi. Retineret +3

Kommentar . Der holdes fortsat øje med fissur 7+,-6. Intet klinisk at
se på -6

OBS 7+ flade 1. STOR OBS

OBS 6- flade 1.

Caries 7- flade 1.

Tandrensning over 14 tænder.



9 aftaler frem til april 2018 uden aktion
Så sendes journalen til Kbh



Diagn.:

Harmonisk profil DS3M2 8+8 og 8-8 tilstede med pladsmangel +03 persisterer +3 højlab. fac. og i trangstl.

HOB normal

Okkl.: let dist. hs og normal vs.

VOB normal

Trans.: OK front forskudt og let kippet mod vs., smal OK vs..

Plads: pladsmangel 8+8 og 8-8 trangstl. +3, UK front.

Funktion: i.a. +3 generer læben.

Formål: at nedsætte psykosocial belastning

Mål: normalisere okkl. på alle planer, normalisere pladsforhold i OK og UK

Beh. plan:

1. henvise til ex./amotio 8+ og 8-8

ex. +03

der afventes med at fjerne +8 indtil vi er sikker på at +3 kan flyttes.

2. fast app. OK let spir regio +3 og nedføre +3

forbehold for at +3 ankyloserer.

3. fast app. UK

4. el. træk: nok mest kl2 hs.

5. Ret. med snap til OK og trådfix UK front.

6. I tilfælde at +3 ikke kan flyttes, skal den fj.

dernæst lukkes bagfra med en mesializer.

Pris ?