

Uddeleringsinstruks: Tandrensning af supragingival tandsten

Personale gruppe:/gældende for: Klinikassistenter og klinikassistentelever	Udarbejdet af: Pia Johansson	Ansvarlig: Det principielle ansvar: Overtandlæge Lars Høvenhoff
Dato for ikraftsættelse: 1. August 2020	Sidst ajourført: 6.december 2023 af TP Pia Johansson	Ajourføring af denne instruktion sker ved fremkomst af nye faglige/videnskabelige anbefalinger og senest: december 2026

Uddannelse/forudsætninger:

For klinikassistenter skal en af følgende punkter være opfyldt:

Gennemført tandrensningskursus på godkendt uddannelsesinstitution

Tandrensning som tilvalgsmodul i uddannelsen

Gennemført tilvalgsmodul i tandrensning på skoleforløbet.

For klinikassistentelever, skal de have gennemført tilvalgsmodulet i tandrensning på skoleforløbet.

Behandleren skal kunne identificere og fjerne supragingivale bløde og hårde belægninger samt misfarvninger ved hjælp af håndinstrumenter og maskinel rensning og følge regler for sikkerhed under hensyntagen til mundhulens anatomi, slimhindestrukturer og morfologi

Formål:

Fjernelse af supragingival tandsten og let tilgængelig subgingival tandsten, misfarvninger og plak.

Hjælpe patienten til at opretholde sunde parodontale forhold, standse sygdomsrecidiv ved at fjerne plakretinerende faktorer.

Opgave afgrænsning:

Gælder på unge sunde patienter på både temporære og permanente tænder

Kan også være en del af småbørns undersøgelsen 3-6 år

Gælder omsorgs- og specialtandpleje patienter

Kontraindiceret på blødere, hvis patienten ikke ønsker behandlingen, eller der ikke er Kooperation til behandlingen.

CAVE: Ved antikoagulerende medicin.

Instruktion:

I journalen noteres fund af tandsten og hvor. Patienten informeres om fundet og samtykke indhentes til depuration af tandsten.

Depuration af tandsten foretages med curette supragingivalt med forsigtighed ved gingiva

God fingerstøtte, modificeret pennegreb med fingerstøtte med ringfingeren så tæt på det sted, der scales

Vinklen mellem instrumentets facialflade og tandfladen skal ca. Være 70 grader

Scaler rengøres løbende med en serviet, vatrulle eller sug. Der kan skylles med vand undervejs.

Der kan foretages kontrol ved tørlægning og/eller sondering, om alt tandsten er væk

Ved behov kan patienten skylle efter med vand

Samtykke og behandling noteres i journalen med navn på den brugte pudsepasta, hvis dette er brugt

Der tages stilling til, om der er behov for opfølgning eller indkald inden næste undersøgelse, samt om patienten har brug for instruktion i tandbørstning og/eller tandtråd

Behandling:

Patientsikkerhed:
