

Håndtering af MRSA og CPO-bærende patienter

- Herved forstås: Patienter der er kendte bærere af MRSA- eller CPO- (carbapenemase-producerende organismer)-smitte. Dette kan ses i Nexus eller ved gennemgang af anamnese, hvor dette bør noteres under evt. smitsomme sygdomme.

Personale gruppe:/gældende for: Alle ansatte i Voksentandplejen	Udarbejdet af: CJ	Ansvarlig: Det principielle ansvar: Overtandlæge Anne Kaae-Nielsen
Dato for ikraftsættelse: 1/3-2020	Sidste ajourført: 10/5-24 CJ	Ajourføring af denne instruktion sker ved fremkomst af nye faglige/videnskabelige anbefalinger og senest: marts 2027

Uddannelse/forudsætninger: Ansættelse i voksentandplejen med patient-kontakt

Formål:

At hindre smitte af MRSA-bakterier fra kendte MRSA-bærere til tandplejens personale eller andre patienter.

Opgave afgrænsning:

At sikre nødvendige infektionshygiejniske tiltag i forbindelse med håndtering af risikopatienter.

Instruktion:

Der anvendes de generelle infektionshygiejniske retningslinjer samt en enkelt supplerende i form af engangsplastforklæde eller engangsheldragt.

Dvs:

- Tilrettelæggelse af arbejdsprocedurer (sørge for at have alle nødvendige instrumenter ol. tilgængelige, så der ikke skal rodes unødigt under behandling/undersøgelse)
- Håndhygiejne (vask og sprit som normalt)
- Kliniktøj (arbejdsdragt), herunder engangsplastforklæde.
- Anvendelse af personlige værnemidler (mundbind, briller, handsker)
- Rengøring
- Desinfektion
- Sterilisation

I omsorgstandplejen anvendes væskeafvisende engangsovertrækskittel som overtræk over kliniktøjet ved behandling af MRSA- og CPO-positive patienter. Kitlen skal være langærmet og slutte tæt ved handleddene.

Kitlen kasseres som dagrenovation efter brug.

Patienten sættes til som sidste patient på dagen.

Patientsikkerhed: Hindre smittespredning af MRSA og CPO