

Drejebog for telefonisk henvendelse for traume samt akutte traumepatienter som møder op på klinikken

Telefonisk henvendelse ang. traume:

Telefonisk henvendelse:

- Spørge ind til uheldet, hvornår, hvordan og hvor skete skaden
- Er det en primær eller permanent tand?
- Er tanden løs?
- Berolige den voksne – har vedkommende selv set barnet?
- Information om farveændring, øget kuldefølsomhed, absces og skånekost
- Information om skånsom tandbørstning, typisk en uge
- Informere at skaden kan/skal meldes til forsikringen
- Har der været bevidsthedssvækkelse (herunder hovedpine/opkastning), skal forældrene opfordres til at kontakte læge/vagtlægen
- Ved tvivl om skadens omfang, kan forældre evt. sende et billede af skaden
- Noter i journalen/ brug frasen i TK2

Telefonisk henvendelse hvor patienten skal ses samme dag

- 1) Hvis mælketanden har flyttet sig i kæben, så barnet ikke kan bide sammen for tanden. (Lateral luksation)
- 2) Hvis tanden "hænger" meget og barnet ikke kan bide sammen. (extrusion)
- 3) Hvis tanden ikke kan ses i munden, kan der være risiko for, at den er skubbet op i den blivende tand. (intrusion) eller at tanden er mistet/faldet ud (eksartikulation)
OBS: Er tanden evt skubbet helt op i knoglen? Eller andre steder.
- 4) Stor fraktur med kommunikation til pulpa. (fractura coronae complicata)

Telefonisk henvendelse hvor det **ikke er nødvendigt at se patienten:**

- 1) Ømme tænder men ingen løsning eller blødning fra parodontalspalten. (concussio)
- 2) Let løsning og ømhed. Ingen forskydning af tanden (subluxatio)
- 3) Let forskydning af tanden hvor barnet kan bide normalt sammen. (lateral luxation)
- 4) Knækket hjørne af uden pulpaeksponering (fractura coronae non complicata)

Akut modtagelse af traumepatient på klinikken:

- Spørge ind til uheldet
- Berolige barnet og evt. den voksne. Vurdere skadens omfang
- Finde journalen (evt. tidligere traume)
- Patient i stolen
- Skaffe sig et overblik
- Tørre evt. blod af ansigt og hænder
- Se efter evt. blødning fra gingiva, og om der evt. er løsning af tanden, afvaskning med chlorhexidin
- Er der fraktur eller andet
- Tjekke om der er sammenbid.
- Vurdere skadens omfang, skal der evt. henvises til tandlæge eller tandplejer
- Røntgen: Der skal optages røntgenbilleder i forbindelse med traumer hvor tanden ikke ses i munden, og tanden ikke er fundet på anden vis. Tandlæge eller tandplejer beskriver røntgen snarest muligt.
- Information om farveændring, absces og skånekost samt forsikring
- Information om skånsom tandbørstning
- Individuel kontrol efter traume

Informere pt/forældre om at melde skaden til forsikringen.

Medgiv traumeerklæring hvis der er tandplejer eller tandlæge tilstede.