

Medicin generelt.

Der er større risiko for udvikling af huller ved brug af medicin. Skal barnet have medicin er der nogle ting vi skal være opmærksomme på.

- Vælg præparat uden tilsat sukker hvis muligt.
- - en del medicin kan fås uden sukker – spørg lægen eller apoteket.
- Medicin kan være meget sød og sukkerholdig og klæber ofte til tænderne.
- -derfor er det vigtigt at være ekstra omhyggelig med tandbørstningen.
- Ved spædbørn kan medicinen lettest gives bag i munden med en engangssprøjte – evt. samtidig med at barnet er sultent.

Astmamedicin

- Astmamedicin ændrer mundhulens bakterieflora, og derfor får barnet lettere svampeinfektion.
- En del af det barnet inhalerer sætter sig som belægninger på tænderne og tungen.
- Mængden af spyt kan være nedsat pga. medicinen.
- -derfor kan der være større risiko for udvikling af caries.

HUSK ALTID AT BØRSTE TÆNDER EFTER INDTAGELSE AF MEDICIN.

Movicol: afføringsmiddel til kronisk forstoppelse.

- Mange blander movicol i saft, juice, sodavand eller lignende, OBS for syreskader/caries
- -der er derfor vigtigt, at der skylles efter med vand efter brug.

Jerndråber og vitamin – tyggetabl.

- Kan misfarve tænderne, skyl derfor efter med vand.